

安適股份有限公司

定期給藥
感染不蟲復



動物用錠劑 動物藥製字第 08699 號
每盒30錠

腸淨能 Worm Buster




產品特色

牛肉鮮奶風味 適口性更佳

GMP藥廠生產，品質保證

成犬及幼犬均可安全使用，無任何副作用，一次給藥即可有效驅蟲
每顆錠劑上設計十字型切痕，方便大、中、小型犬不同劑量之投藥



記得定期為毛小孩驅蟲

腸內寄生蟲會影響犬隻的營養吸收，
造成胃腸道發炎，嚴重影響犬隻的健康！

腸淨能 Worm Buster

專為犬隻設計之廣效配方，能驅除
一般線蟲類寄生蟲（蛔蟲、鉤蟲、鞭蟲）
更能驅除扁蟲類寄生蟲（條蟲）之感染





什麼是 犬隻腸道寄生蟲？

Hookworms, Roundworms, Whipworms and Tapeworms



鞭蟲

鞭蟲 (*Trichuris vulpis*) 寄生於犬隻的盲腸、結腸及直腸，吸食犬隻腸道之血液、體液及黏膜上皮組織，引起體重減輕、貧血甚至出現血痢。鞭蟲卵對環境的抵抗力很強，在土壤中甚至可存活數年之久。人及動物可因食入蟲卵而受感染。

條蟲

可感染犬隻的條蟲有許多種，條蟲通常需要中間宿主的存在 (*Mesocestoides spp.* 需要兩階段的中間宿主) 來完成其生活史，食肉動物 (包括犬隻) 通常是其最終宿主，而人類則扮演中間宿主或最終宿主的角色。不同種類的條蟲會在動物身上造成不同的傷害，包括在各組織臟器中形成逐漸擴大及轉移之包囊 (*Echinococcus granulosus*; *Echinococcus multilocularis*) ; 條蟲幼蟲出現在肌肉或漿膜 (*Taenia spp.*) 中而造成動物肌肉或組織節結; 條蟲幼蟲寄生於腦脊液中 (*Multiceps multiceps*) 而導致動物出現運動失調之神經症狀。條蟲在最終宿主-犬隻之體內會引起胃腸道發炎，大量蟲體之存在亦可造成腸道阻塞。犬蚤或貓蚤為犬條蟲 (*Dipylidium caninum*) 之中間宿主，由於外寄生蟲之持續感染而讓犬條蟲感染症難以根除。

鉤蟲

鉤蟲 (*Uncinaria stenocephala*; *Ancylostoma caninum*) 為犬隻重要寄生蟲，環境中的幼蟲可經由食入或穿入皮膚而感染動物，寄生於小腸之鉤蟲會吸取犬隻體內養分，嚴重者甚至引起低蛋白血症。鉤蟲亦會傳染給人。

蛔蟲

蛔蟲 (*Toxascaris leonina*; *Toxocara canis*) 的寄生會傷害腸道黏膜組織並影響犬隻的營養吸收。成犬感染蛔蟲往往沒有明顯症狀，而幼犬感染則可能會致命。有些種類的蛔蟲 (*Toxocara canis*) 會在犬隻體內移行而造成組織器官之穿孔及傷害，而蟲體經胎盤或乳汁之移行可使幼犬在一初生即受到感染。人亦可因蟲卵汙染食物而被感染。

主要成分：每錠含

Febantel	150mg
Pyrantel Pamoate.....	144mg
Praziquantel.....	50mg

用法用量：

- 直接吞服，亦可包於肉中或磨粉置於食物中給食，使用前不需禁食。
- 幼犬兩周齡以上即可開始服用，建議整窩幼犬同時驅蟲。
- 首次驅蟲或嚴重感染情形建議於第一次投藥兩周後再次投藥。
- 建議成犬每三個月驅蟲一次。

幼犬及小型犬：

- 0.5-2公斤體重使用1/4錠
- 2-5公斤體重使用1/2錠
- 5-10公斤體重使用1錠

中型犬：

- 10-20公斤體重使用2錠
- 20-30公斤體重使用3錠

大型犬：

- 30-40公斤體重使用4錠

注意事項：

- 本藥品由飼主、畜禽水產養殖業者或飼料廠依獸醫師(佐)處方使用。
- 懷孕母犬亦可使用，但須遵照指示用量
- 有效期過後請勿使用
- 勿讓小孩接觸
- 家畜禽請勿使用
- 勿與Piperazine同時使用



Worm Buster